

Com treballar des de l'empresa la prevenció i detecció precoç del càncer de pròstata



El càncer de pròstata és el més comú entre els homes. El factor principal de risc per al seu desenvolupament és l'edat, i és el més freqüent en homes de més de 50 anys.



Els tractaments depenen de l'estadi evolutiu de la malaltia. L'extirpació quirúrgica de la pròstata o la radioteràpia són tractaments habituals en aquesta malaltia.



La prova de PSA ajuda a detectar el càncer de pròstata en una etapa primerenca quan té més possibilitats de guarir-se. No tothom que té un nivell alt de PSA tindrà càncer i no tothom que tingui càncer necessitarà tractament.



Tot i això, és freqüent que es requereixi també un tractament sistèmic hormonal amb l'objectiu de bloquejar els andrògens, responsables de l'estimulació de creixement tumoral.



Una prova de PSA consisteix en un anàlisi de sang amb què es mesura el nivell de la proteïna d'antigen prostàtic (PSA) a la sang.



Quan es produeix metàstasi del tumor a altres òrgans, pot ser necessari un tractament amb quimioteràpia o altres fàrmacs hormonals de darrera generació.



Els nivells alts de PSA no signifiquen necessàriament que tingui càncer de pròstata, però cal examinar més per descartar el càncer de pròstata.



El tractament integral del càncer de pròstata no només augmenta l'esperança de vida dels pacients, sinó també, en pot millorar el benestar i la qualitat de vida.



Per als homes a partir de 50 anys i 45 amb antecedents familiars, és important parlar amb el metge de família sobre els riscos i beneficis de realitzar el PSA, i si la prova és apropiada per al seu cas.



És necessari un canvi cultural perquè la població masculina es preocupi més per la salut, alhora que eliminar els tabús que van associats al càncer de pròstata.

Organitza:



Amb el suport de:

